

Grisenyt fra dyrlægen




Nyt fra praksis – November 2006 Nr. 74

Lars Rasmussen - Jesper S. Olesen - Dorte Risum - Bjarne Ellegaard -
Kristian Viekilde - Torben Svendsen - Hans Bundgaard

www.fynvet.dk Tlf. 6262 3074

Tlf. tid bedst mellem 7:30 og 8:30

Hvad kommer du i dit foder?



Ring til os, hvis du er i tvivl om du kan **miste 6 % af hektarstøtten i det kommende år**. Vi finder en løsning der er skræddersyet til dit behov og din produktion.

Alternativer til traditionel kastration

Med den øgede fokus på dyrevelfærd bliver der set en del på alternative metoder til traditionel kastration. Som mange nok ved, er det i Norge forbudt at kastre uden bedøvelse. I flere lande benyttes hormon indsprøjtning til kastration.

Hangrisene i slagtesvinestalden bliver sprøjtet 2 gange med 4-6 ugers mellemrum med et hormon, der bl.a. kan nedbringe skatoltallet. Denne behandling skulle angiveligt også forbedre bl.a. foderforbruget, og der er ikke blevet registreret forskel i tekstur og smag af kødet.



I Danmark arbejder man dog på at lave en CO₂-bedøver. Udviklingen af et apparatur er nået langt, og foreløbige undersøgelser har vist, at det er en forholdsvis nem procedure. Grisene blev sat ned i en kasse med CO₂ gas i 1-2 minutter, og blev bevidstløse efter ca. 15 sekunder. Man mangler dog endnu en vurdering af sikkerhed og anvendelighed under normale produktionsforhold.

Behandlingsplaner på russisk

Vi har udfærdiget behandlingsplaner, hvor der både er russisk og dansk tekst på samme laminerede ark.

Behandlingsplanerne tilpasses jeres besætning.

Sig til hvis I ønsker dette. Det er vigtigt at den udenlandske arbejdskraft forstår, hvordan og hvorfor der behandles!

Griseligaen er i gang

Mange har lavet fremragende resultater!

Følg med på www.fynvet.dk

Fodring af søer i drægtigheden

Vejledende foderkurver til hhv. søer og gylte.

Ud fra so kurven kan man lave en kurve til magre, normale og fede søer.

Dage	Søer FEdr	Gylte FEdr
1-28	2,6	2,5
30-80	2,2 – 2,6	2,4 - 2,7
80-90 - 114	2,6 – 3,5 (optil 3,8)	2,7 – 3,5

Farestald: Husk gradvis nedgang inden faring. Søer er vant til højt foderindtag!

Det er vigtigt, at magre søer og søer med begyndende skuldarsår kommer op på 3 – 3,5 Fes med det samme efter fravæning.

Salmonella og syre...

Det er ikke tilladt at tilsætte myresyre til vandet, da grise altid skal have adgang til frisk drikkevand. I stedet kan tilsættes tørtsyre til foderet. Danske Slagterier vurderer at et indhold på min. 0,5 % organisk syre i foderet kan erstatte 2 promille myresyre på vandet. Er du i tvivl, så spørg os ved besætningsbesøget.

Ny indstillelig pumpe til Baycox

Som flere af jer måske ved er det nu muligt at få en indstillelig pumpe til 1 liter Baycox flaske. Pumpen passer også til 250 ml flasken og kan indstilles fra 0,2 ml til 2 ml.



KURSUS KALENDER

☺Kursus i SUNDHED OG SYGDOMME I KLIMASTALDEN.

Trænger dine folk til en genopfriskning i, hvordan man passer nyfravænnede? Eller opdages grise med lungesyge ikke tidligt nok til at kunne gribe effektivt ind? Så er dette kursus noget for dem! Kurset afholdes tirsdag d. 21. november kl. 14-16 på Gørtlervej 6, 5750 Ringe. Pris 450 kr. Underviser Dorte Risum. Tilmelding senest fredag d. 17. november på tlf. 6262 3074, fax 6262 4490 eller e-mail: post@fynvet.dk

Mvh: Lars Rasmussen (22 12 87 16), Hans Bundgaard (21 67 71 94), Torben Svendsen (40 56 25 37), Kristian Viekilde (30 95 24 40), Dorte Risum (23 40 70 55), Jesper S. Olesen (40 79 28 00) og Bjarne Ellegaard (20 74 70 50)

Redaktører: Dorte, Kristian, Hans